



Kalve har et suttebehov

Kalve har behov for mælk, men også for at indtage den på en bestemt måde. Med automatisk mælkefodring har kalvene mulighed for også at få tilfredsstillet deres suttebehov. Dette kan reducere forekomsten af unormal sutten på andre kalve, men mælkemængde og fravænningsmetode har også betydning.



Det er unormal adfærd når kalve sutter på hinanden

Effekt af mælkemængde

Kalve på lav mælkemængde forventes at udføre mere unormal sutteadfærd end kalve på høj mælkemængde i mælkefodringsperioden.

Unormal sutten på andre kalve er uønsket fordi det medfører hårløshed, hævelser og infektion. Unormal sutten kan også medføre at kvier og køer senere patter hinanden dvs. yverpatning.



Kalvene bestemmer selv, hvornår, men ikke hvor meget de vil drikke.

Effekt af fravænningsmetode

Kalve på trinvis fravænnning forventes at udføre mere unormal sutteadfærd end kalve på pludselig fravænnning.

Forsøget er begyndt i september 2004 og vil i alt inkludere 72 kalve. Kalvene indgår i forsøget, når de er ca. 10 dage gamle, og følges indtil de er fravænnet ved en alder af ca. 8 uger. Kviekalvene følges derefter til de er 2 år gamle.